

1.27 – Multiplex – Amostra urinária

- Solicitar no laboratório um frasco estéril para coleta de urina
- A amostra a ser coletada deve ser preferencialmente a primeira urina da manhã ou, em casos que necessite de urgência, após a retenção urinária de pelo menos 4 horas.
- Lavar as mãos com água e sabão neutro. Secar com a toalha limpa;
- Realizar a higiene da região genital com água e sabonete neutro e secar com toalha limpa ou gaze estéril;
- Abrir o frasco apenas no momento da coleta;
- Para os homens: retrair o prepúcio com uma das mãos e com a outra segurar o frasco já aberto;
- Para as mulheres: sentar no vaso sanitário, com uma das mãos segurar o frasco já aberto e com a outra mão afastar os grandes lábios da vagina;
- Coletar **O PRIMEIRO JATO** de urina diretamente no frasco (10 mL);
- Desprezar o restante da micção no vaso sanitário; se tiver solicitação de parcial de urina, coletar o restante da urina (jato médio) em outro frasco;
- Tampar o frasco e levar imediatamente ao laboratório, no máximo 2h após a coleta;

OBSERVAÇÃO: A coleta deve ser realizada preferencialmente antes do início da antibioticoterapia (de uso oral ou tópico na região genital), ou a critério médico.